



Catalogue

PROTECTION ET NUTRITION
DES PLANTES



VOS CULTURES ONT DROIT AU MEILLEUR

L'AFRIQUE EST BELLE !

Nous devons ensemble relever le défi d'y améliorer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté, protéger l'environnement et développer une industrie compétitive.

Le secteur agricole africain constitue le principal pourvoyeur d'emplois et, pour assurer une croissance agricole soutenue permettant de subvenir aux besoins fondamentaux de la population, nous devons promouvoir un développement agricole reposant sur la maîtrise des techniques culturales d'intensification.

La mission de SAVANA est de participer activement à ce défi.

« L'intensification durable de l'Agriculture »

C'est un facteur d'autant plus important aujourd'hui que les pays africains doivent assurer la compétitivité de leur agriculture dans un contexte de mondialisation marqué par de très fortes variations de nombreuses productions agricoles sur les marchés nationaux et internationaux.

L'introduction, le développement et la promotion de nouveaux systèmes de production font partie des moyens que SAVANA souhaite mettre à la disposition du plus grand nombre d'agriculteurs et d'opérateurs économiques.

« La terre nous a été prêtée par nos enfants »

Faisons en sorte de la leur rendre dans l'état ou nous l'avons reçue.

LÉGENDES

Gammes de produits

-  Herbicides
-  Insecticides
-  Hygiène Publique
-  Bio
-  Fongicides
-  Nutrition
-  Semences

Iconographie

-  Herbicide Total
-  Herbicide pré-levée
-  Herbicide post-levée
-   Insecticide nématocide
-  Insecticide acaricide
-   Insecticide contre les chenilles
-   Insecticide contre les piqueurs/suceurs
-  Insecticide contre les moustiques
-  Indication de dosage

Lexique types de formulations :

- CS** : suspension de capsules
- DP** : poudre pour poudrage
- EC** : Concentré émulsionnable
- FS** : Suspension concentrée pour traitement des semences
- GE** : Produit générateur de gaz
- GR** : Granulé
- OD** : Substance huileuse
- PA** : Latex
- SC** : Suspension concentrée
- SG** : Granulé soluble dans l'eau
- SL** : Concentré soluble
- SP** : Poudre soluble dans l'eau
- UL** : Liquide pour application à ultrabas volume
- WG** : Granulé dispersable
- WP** : Poudre mouillable
- WS** : Poudre mouillable pour traitement humide des semences.

savana

LA PUISSANCE D'UN GROUPE



HORIZON PHYTO PLUS



PROPHYMA SA



ALBISIA

Sénégal

Tél. : (+221) 33 943 44 80

(+221) 77 149 68 68

ANTEOR

Togo

Tél. : + 228 91 63 14 05 / 91 81 57 26

HPP

Cameroun

Tél. : +237 695 39 95 93

INDIGO

RDC

Tél. : +243 (0) 990 77 42 90

PROPHYMA

Burkina Faso

Tél. : +226 20 98 39 40 / 20 98 58 29

POINT VERT

Gabon

Tél. : +241 011 72 06 56 / 011 76 48 99

SAVANA NIGER

Niger

Tél. : +227 96 95 28 65


SAVANA CÔTE D'IVOIRE

Côte d'Ivoire

Tél. : + 225 07 69 91 49 30

SOMMAIRE

HERBICIDES	P.4
HERBICIDES TOTAUX	P.5
HERBICIDES DE PRÉ-LEVÉE	P.6
HERBICIDES DE PRÉ-LEVÉE ET POST-LEVÉE	P.7 à 8
HERBICIDES DE POST-LEVÉE	P.9
INSECTICIDES	P.10
PIQUEURS SUCEURS	P.11 à 13
CHENILLE	P.14 à 15
ACCARICIDE	P.16
NEMATICIDE	P.17
HYGIÈNE PUBLIQUE	P.18 et 20
BIO	P.21 à 28
FONGICIDES	P.29 à 32
NUTRITION	P.33
GAMME FOLIGA	P.34
ENGRAIS GRANULE / SOLUBLE	P.35 à 38
AMELIORATEURS DE SOLS	P.39
ACIDES HUMIQUES	P.40
BIOSTIMULANTS	P.41 à 42
STIMULATION	P.43 à 44
CORRECTEUR DE CARENCES	P.45 à 46
ADJUVANT / MOUILLANT	P.47
SEMENCES	P.48
CUCURBITACEES	P.49 à 50
DIVERS	P.51 à 54
SOLANACEES	P.55 à 56
SEMENCES SAVANA	P.57 à 63
PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE	P.64
FILIALES	P.65



LES S E N E G A L I O



savana

HERBICIDES

totaux



FINISH® 68 SG

*Herbicide total systémique
non sélectif*

Formulation
SG

Composition
Glyphosate :
680 g/kg

Groupe
HRAC : 9

Culture
Toutes cultures

1 à 2Kg/
ha



FINISH® 360 SL

*Herbicide total systémique non
sélectif*

Formulation
SL

Composition
Glyphosate acide : 360 g/l

Groupe
HRAC : 9

Culture
Toutes cultures

2-4
l/ha

savana

HERBICIDES

pré-levée



PRÉ-LEVÉE

PENDISTAR® 455 CS

Herbicide antigerminatif de pré-levée à large spectre

Formulation
CS

Composition
Pendimethaline : 455 g/l

Groupe
HRAC : 3

Culture
Coton | Maïs | Oignon | Mil
| Sorgho | Nèbe | Arachide
| Haricot | Soja | Canne à sucre...



1 à 2,5L/ha



PRÉ-LEVÉE

PENDISTAR® 400 EC

Herbicide antigerminatif de pré-levée à large spectre

Formulation
EC

Composition
Pendimethaline : 400 g/l

Groupe
HRAC : K1

Culture
Coton | Maïs | Oignon
| Mil | Sorgho | Nèbe |
Arachide | Haricot | Soja |
Canne à sucre



1 à 3 l/ha



PRÉ-LEVÉE

METONYX® 960 EC

Herbicide systémique de pré-levée à large spectre

Formulation
EC

Composition
S-metolachlore : 960 g/l

Groupe
HRAC : 15

Culture
Coton | Maïs | Mil | Sorgho |
Nèbe | Arachide | Haricot |
Soja | Canne à sucre | Ananas
...



0,5-2 l/ha



savana

HERBICIDES

pré-levée et post-levée



PRÉ-LEVÉE



POST-LEVÉE

OXO[®] 250 EC

Herbicide complet

Formulation
EC

Composition
Oxadiazon : 250 g/l

Groupe
HRAC : 14

Culture
Oignon | Riz

1-2
l/ha



PRÉ-LEVÉE



POST-LEVÉE

OXI[®] 240 EC

Herbicide selectif

Formulation
EC

Composition
Oxyfluorène :
240 g/l

Groupe
HRAC : 14

Culture
Oignon

0.5 à
1.5L/ha



PRÉ-LEVÉE



POST-LEVÉE

METRIBUSAV[®] 210 SC

*Herbicide
systémique complet*

Formulation
SC

Composition
Metribuzine :
210g/l

Groupe
HRAC : 5

Culture
Carotte | Pomme
de Terre | Canne à
sucre

1
l/ha



savana

HERBICIDES

post-levée



POST-LEVÉE



SAPHIR® 30 OD

Herbicide systémique complet de post-levée

Formulation
OD

Composition
Rimsulfuron : 30 g/l

Groupe
HRAC : 2

Culture
Tomates | Pommes de terres

0,5-1
l/ha



POST-LEVÉE



MALO BINFAGA® 720 SL

Herbicide systémique anti-dicotylédone de post-levée

Formulation
SL

Composition
2,4-D sel de diméthylamine : 720 g/l

Groupe
HRAC : 4

Culture
Riz | Canne à sucre
| Maïs | Mil | Sorgho
| Hévéa | Café |
Palmier | Bananes

1-2
l/ha



KIZA® 100 EC

Herbicide systémique anti-graminée de post-levée

Formulation
EC

Composition
Quizalofop-P-ethyl : 100 g/l

Groupe
HRAC : 2

Culture
Coton | Cultures dicotylédones | Oignon

0,9
l/ha



POST-LEVÉE



MALIK® 108 EC

Herbicide systémique anti-graminée de post-levée

Formulation
EC

Composition
Haloxypop-P-méthyl : 108 g/l

Groupe
HRAC : 1

Culture
Coton | Cultures dicotylédones | Oignon


0,9
l/ha



savana

HERBICIDES

post-levée



POST-LEVÉE

RAMSES® 30 OD

Herbicide systémique complet de post-levée

Formulation
OD

Composition
Rimsulfuron : 30 g/l

Groupe
HRAC : 2

Culture
Maïs ■

0,5-1
l/ha



POST-LEVÉE

ZAMZAL® 70 EC

Herbicide systémique complet de post-levée

Formulation
EC

Composition
Quizalofop-p-ethyl :
35 g/l
Imazamox : 35g/l

Groupe
HRAC : 1
HRAC : 2

Culture
Haricot | Niébé | Pois |
Soja | Arachide ■

0,5-1
l/ha



POST-LEVÉE

RUBIS® 100 SC

Herbicide selectif de post-levée

Formulation
SC

Composition
Bispyribac-sodium :
100 g/l

Groupe
HRAC : 2

Culture
Riz ■

0.5 à
1L/ha




INSECTES



savana

INSECTICIDES

Piqueurs suceurs



BIOPIQ®

*Insecticide biologique
contre les insectes
piqueurs-suceurs et
acariens*

Formulation
SL

Composition
Matrine : 0.6%

Culture
Maraîchères | Céréales |
Fruitières

Cibles
Acariens, Pucerons,
Aleurodes, Thrips, Jassides



BENJI® 250 SP

*Insecticide systémique
pour le coton, les cultures
maraîchères et fruitières*

Formulation
SP

Composition
Acetamipride : 250 g/kg

Groupe
IRAC : 4A

Culture
Coton | Maraîchères |
fruitières

Cibles
Aleurodes, Pucerons,
Jassides, Mineuses



savana

INSECTICIDES

Piqueurs suceurs



PACHA®

25 EC

Insecticide binaire large spectre

Formulation
EC

Composition
Acetamipride :
10 g/l
Lambda Cyhalothrine : 15 g/l

Groupe
IRAC : 4A
IRAC : 3A

Culture
Fruitières | Maraîchères |
Vivrières

Cibles
Chenilles de lépidoptères,
pucerons, aleurodes, jassides,
thrips

1
l/ha



KALIOL®

Matière active
Mettre 3 dosages

Pour améliorer l'efficacité du phytosanitaire, appliquer à des concentrations allant de 5 à 10 cc/l

Seul : comme insecticide naturel. Appliquer à des concentrations de 20 - 30 cc /l.

Pour le lavage du matériel végétal, des plantes ou des fruits, la concentra-

tion varie de 10 à 50 cc/l. Appliquer de l'eau en abondance pour compléter le lavage et éliminer les résidus.

5-10
l/ha



TAMEGA®

25 EC

Insecticide à large spectre

Formulation
EC

Composition
Deltaméthrine :
25 g/l

Groupe
IRAC : 3A

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Chenilles, Pucerons,
Charançons,
Doryphores,
Cochenilles,
Mouches des fruits,
Criquets

0,5 à
1L/h



savana

INSECTICIDES

Piqueurs suceurs



SPINOCUR® 480 SC

Insecticide biologique contre les ravageurs des cultures maraîchères, fruitières et céréalières

Formulation
SC

Composition
Spinodosad : 480 g/l

Groupe
IRAC : 5

Culture
Céréalières | Maraîchères |
Fruitières

Cibles

Chenilles, Thrips, mouche des fruits, mouches mineuses...

0,1-0,2
l/ha



JAZZFIRE® 500 WG

Insecticide spécifique contre les piqueurs-suceurs.

Formulation
WG

Composition
Flonicamide 500g/kg

Groupe
IRAC : 29

Culture
Coton / Maraîchères /
Fruitières

Cibles


Jassides, Aleurodes, Pucerons, Thrips, Punaises, Cochenilles

100
g/ha

savana

INSECTICIDES

Chenilles



BIOK® 16

Insecticide biologique contre les ravageurs du coton, des cultures maraîchères et céréalières

Formulation
WP

Composition
Bacillus thuringiensis : 16 000 UI/mg

Groupe
IRAC : 11

Culture
Coton | Maraîchères | Céréales

Cibles

Pièrides, Mineuses, Noctuelles, Tordeuses, Teignes et Foreurs de tiges



1-2
kg/ha



INDOXAN® 50 EC

Insecticide large spectre

Formulation
EC

Composition
Indoxacarbe : 50 g/l

Groupe
IRAC : 22A

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles

Chenilles, Punaises, Cicadelles, Altises, Charançons, Coléoptères



0,5-
0,75
l/ha



INDOXAN® PRO 350 WG

Insecticide large spectre

Formulation
WG

Composition
Indoxacarbe :
350 g/kg

Groupe
IRAC : 22A

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles

Chenilles, Punaises, Cicadelles, Altises, Charançons, Coléoptères



72-100
g/ha



savana

INSECTICIDES

Chenilles



EMACOT®

050 WG

*Insecticide
anti-chenilles*

Formulation
WG

Composition
Emamectine benzoate : 50 g/kg

Groupe
IRAC : 6

Culture
Coton | Maraîchères | Céréales

Cibles
Chenilles

200-240
g/ha



EMARON®

*Insecticide double action contre
les chenilles*

Formulation
EC

Composition
Emamectine benzoate : 20 g/l
Lufenuron : 80 g/l

Groupe
IRAC : 6
IRAC : 15

Culture
Coton | Maraîchères | Céréales

Cibles
Chenilles

0,5
l/ha


savana

INSECTICIDES

Acaricides



ACARIUS® 18 EC



Insecticide-Acaricide
pour les cultures
maraîchères et
fruitières

Formulation
EC

Composition
Abamectine : 18 g/l

Groupe
IRAC : 6

Culture
Maraîchères -
Fruitières

Cibles
Acariens, Thrips,
Mouches mineuses

0,5-1
l/ha



BIOPIQ®



Insecticide
biologique contre
les insectes
piqueurs-suceurs
et acariens

Formulation
SL

Composition
Matrine : 0.6%

Culture
Maraîchères
| Céréales |
Fruitières

Cibles
Acariens,
Pucerons,
Aleurodes, Thrips,
Jassides

1
l/ha



ESSEM® 800 WG



Acaricide naturel

Formulation
WG

Composition
Soufre : 800 g/kg

Groupe
IRAC : UN

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Acariens

5-7,5
kg/ha



ETOILE® 150 WP



Acaricide pour
les cultures
maraîchères et
fruitières

Formulation
WP

Composition
Etoxazole :
150 g/kg

Groupe
IRAC : 10B

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Acariens

200
g/ha



savana

INSECTICIDES

Nematicides



NEMA B2®

Insecticide-Nématicide pour le traitement du sol

Formulation
GR

Composition
Abamectine : 50 g/kg

Groupe
IRAC : 6

Culture
Toutes cultures

Cibles
Nématodes

10-20
kg/ha



NEMGUARD® GR

Insecticide-Nématicide d'origine naturelle et sans résidu

Formulation
GR

Composition
Extraits d'ail : 45 %

Culture
Toutes cultures

Cibles
Nématodes

20 à 25
kg/ha



NEMGUARD® L

Insecticide-Nématicide d'origine naturelle et sans résidu

Formulation
SL

Composition
Extraits d'ail : 100 %

Culture
Toutes cultures

Cibles
Nématodes

8 à 12
l/ha



HYGIENE PUBLIQUE





ALADIN®

Insecticide fumigant à usage professionnel pour la protection des denrées stockées

Formulation
GE

Composition
Phosphore d'Aluminium : 56%

Groupe
IRAC : 24A

Culture
Denrées stockées

Cibles
Tout nuisibles

1-5
cp/m³

FORTEFOG FUMERS®



Générateur de fumée insecticide prêt à l'emploi contre les insectes volants et rampants. Particulièrement utile dans les situations où la pulvérisation est difficile ou limitée.

Matières actives
\ **Perméthrine** 13,25
% p/p \ IRAC : 3A

Utilisation :
Allumer la mèche (hors présence humaine). Traite jusqu'à 400m³.

VERTOX®



Appât rodenticide prêt à l'emploi pour la lutte contre les rats et les souris dans les lieux et abris couverts (ou de leur abords immédiats).

Matière active
\ 0,005% de Brodifacoum (rodenticide)
\ 0,001% de Denatonium benzoate (agent amérisant)

Conditionnement :
Carton de 5 Kg (100 sachets de 50g)

Pour les rats :
25 à 50g par poste tous les 5 à 10 mètres suivant le degré d'infestation.
Pour les souris :
10 à 15g par poste tous les 5 à 10 mètres suivant le degré d'infestation.

savana

HYGIENE PUBLIQUE



PROTECT DP®

*Insecticide pour les
denrées stockées*

Formulation
DP

Composition
Deltaméthrine :
1 g/kg
Pyrimiphos-méthyl :
15 g/kg

Groupe
IRAC : 3A
IRAC : 1B

Cibles
Alucite, Capucins,
Charançons,
Teignes, Vers de
farine, Silvains,
Tribolium, Bruches

50 g/
100 kg
de grains



TAMEGA® 25 EC

*Insecticide à large
spectre*

Formulation
EC

Composition
Deltaméthrine : 25
g/l

Groupe
IRAC : 3A

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Chenilles, Pucerons,
Charançons,
Doryphores,
Cochenilles, Mouches
des fruits, Criquets

0,5
l/ha





O
M



BIOK® 16

*Insecticide biologique
contre les ravageurs
du coton, des cultures
maraîchères et céréalières*

Formulation
WP

Groupe
IRAC : 11

Culture

Maraîchères | Céréales |
Coton

Cibles

Piérides, Mineuses,
Noctuelles, Tordeuses,
Teignes, Foreurs de tiges

COMPOSITION

BIO K 16

Bacillus thuringiensis :
16 000 UI/mg

0,5-1
kg/ha



KALIOL®

Matière active
Mettre 3 dosages

*Pour améliorer l'efficacité
du phytosanitaire,
appliquer à des concen-
trations allant de 5 à
10 cc/l*

**Seul : comme insecticide
naturel. Appliquer à des
concentrations de 20 -
30 cc /l.**

**Pour le lavage du maté-
riel végétal, des plantes
ou
des fruits, la concentra-**

**tion varie de 10 à 50
cc/l.
Appliquer de l'eau en
abondance pour complé-
ter le
lavage et éliminer les
résidus.**

5-10
l/ha



BIOPIQ®

*Insecticide
biologique contre
les insectes
piqueurs-suceurs et
acariens*

Formulation
SL

Composition
Matrine : 0.6%

Culture
Maraîchères |
Céréales | Fruitières

Cibles
Acariens, Pucerons,
Aleurodes, Thrips,
Jassides

1
l/ha





NEMGUARD® L

*Insecticide-
Nématocide
d'origine naturelle
et sans résidu*

Formulation
SL

Composition
Extraits d'ail : 100 %

Culture
Toutes cultures

Cibles
Nématodes

8 à 12
l/ha



SPINOCUR® 480 SC

*Insecticide
biologique contre
les ravageurs
des cultures
maraîchères,
fruitières et
céréalières*

Formulation
SC

Composition
Spinosad: 480g/l

Groupe
IRAC : 5

Culture
Maraîchères
| Fruitières |
Céréalières

Cibles
Chenilles, Thrips,
Mouche des
fruits, Mouches
mineuses...

0,1-0,2
l/ha



PROFILM®

Profilm est un produit pour
protéger des coups de soleil
et du stress thermique
La couleur blanche du
Kaolin aura également un
effet répulsif contre les
piques d'insectes.

30kg/ha



AGRIPY 5EW®

Insecticide biologique à
très large spectre à base de
pyréthres naturelles, substance
naturelle extrait à partir de
fleurs de Chrysanthème.
Absence de résidu.

250ml
/ha





NEMGUARD® GR

Insecticide-Nématicide d'origine naturelle et sans résidu

Formulation
GR

Composition
Extraits d'ail : 45 %

Culture
Toutes cultures

Cibles
Nématodes

20 à 25
kg/ha



M3® FRUIT FLY BAIT STA- TION

Pièges attractifs prêts à l'emploi pour lutter contre les mouches des fruits

Formulation
Support plastique avec mousse de polyuréthane imprégnée

Culture
Mangues |
Fruitières |
Maraîchères

COMPOSITION
Hydrolysate de protéines
+ Alphacyperméthrine

Cibles
Mouche des fruits

100-400
pièges/ha



INVADER-B-LOK® | INVADER®

Pièges attractifs prêts à l'emploi pour lutter contre les mouches des fruits

Formulation
Bloc de fibres imprégné

Culture
Mangues |
Fruitières |
Maraîchères

Cibles
Mouche des fruits

12
blocs/ha

COMPOSITION
INVADER-B-LOCK : ME + Spinosad
INVADER : ME + Malathion





IDEFIX®

*Fongicide - Bactéricide naturel
pour les cultures maraîchères et
fruitières*

Formulation
WP

Composition
Hydroxyde de cuivre : 65.6%

Groupe
FRAC : M1

Culture
Maraîchères | Fruitières

Cibles

Rouille, Alternariose,
Cladosporiose, Mildiou,
Anthracnose, Cercosporiose,
Bactérioses



ESSEM® 800 WG

Acaricide - Fongicide naturel

Formulation
WG

Composition
Soufre : 800 g/kg

Groupe
IRAC : UN
FRAC : M2

Culture
Maraîchères | Fruitières

Cibles

Acaréens, Oïdium





NATURMIX FE 7®

Mix de oligo-éléments en poudre soluble chélatés par EDTA ou EDDHA (sauf B et Mo sous forme minérale). Possède une forte concentration en fer.

2 à
5kg/h



NATURAL WSP®

Biostimulant très riche en auxine naturelle issu d'extrait d'algues. Le NATURAL WSP va avoir un effet tonifiant et activateur de métabolisme : comme l'activité photosynthétique, la formation du fruit ou le développement racinaire. Contient également 12 % de potassium (K2O).

- stimule l'élongation et le grossissement des cellules
- favorise le développement des racines adventives
- améliore les processus de fructification

0,5
kg/ha



NATURFRUIT COLOR®

Formulation spécialisée à haute concentration en potassium organique, qui accélère l'assimilation et le transport de la potasse dans la plante jusqu'aux fruits.

Ce qui a pour effet :

- D'améliorer et accélérer la production et la mobilisation des sucres dans le fruit.
- Augmenter significativement le poids et la production.
- Éviter une maturation inégale et permet d'obtenir un meilleur remplissage des fruits.

3 à 5l/
ha



NATURQUEL FE 4.0®

Correcteur de carences en fer avec une grande concentration en fer chélate ortho-orto EDDHA, Forme la plus efficace pour corriger la chlorose ferrique. Permet d'apporter du fer aux plantes, en maintenant une grande stabilité dans le sol, même avec un pH élevé.

5-7,5
kg/ha





CYTOPLANT 400®

Promoteur physiologique, stimule la division cellulaire.

Le CYTOPLANT a une haute activité en cytokinines totalement d'origine naturel.

- Induit la division cellulaire
- Augmente le nombre de fleurs
- Réduit la dominance apicale (diminue les entre noeuds, permet d'avoir 1 étage de plus).
- Améliore le poids, le calibre et la coloration en favorisant la croissance latérale des cellules.

1,5l/ha



NATURVITAL - PLUS®

Acides humiques provenant de gisements de Léonarde. Contient 21% d'extraits humiques naturels disponibles immédiatement pour les cultures.

30 à 60l/ha



NATURAMIN-WSP®

Biostimulant très riches en acides aminés (80% p/p), avec de forts degrés de serine et de proline, promoteurs de glycine-bétaïne principaux protecteurs du stress thermique et hydrique. Contient également 12,8% d'azote p/p.

Favoriser l'activité des cultures dans les moments de pics de croissance pour obtenir une productivité maximum.

Aider les espèces végétales à surmonter des situations de stress causées par des phytotoxicités, des sécheresses, des températures extrême et des maladies.

0,5kg/ha



VERGET PROTECT FLOW BIO®

Engrais granulé mixte qui va venir apporter de la potasse, du calcium, du magnésium et du soufre à la plante. Excellent pour la culture de la pomme de terre.

Eléments

- 4 % Azote (N) organique
- 2,5 % Silicium (Si)

2 à 3l/ha



NATURCOMPLET G®

Acides humiques provenant de gisements de Léonarde sous forme de granule. Augmente la fertilité et améliore la structure du sol (capacité d'échange cationique).



30 à 60l/
ha



PLAN PROTECT SI BIO®

Engrais granulé mixte qui va venir apporter de la potasse, du calcium, du magnésium et du soufre à la plante. Excellent pour la culture de la pomme de terre.

100à
150kg
/h



SMARTFOIL®

Le Smartfoil est un biostimulant issu de la fermentation (acide anime, acides fluviatiles, acides organiques, proline, K, Ca, B) sélectionné avec une souche de *Saccharomyces cerevisiae*, il a pour action d'atténuer l'effet des stress abiotiques (température, sécheresse, tempête de sable, etc...)

1 à 2l/
ha



NEUTRAFLORE BTC®

Neutraflore renforce la fertilité biologique des sols, assure une bonne nutrition des plantes et augmente sa résistance face aux aléas climatiques et aux stress. Neutraflore est utilisable en agriculture biologique.

100à
200kg
/ha





SW D N O T

savana FONGICIDE



AZOX® 250 SC

Fongicide systémique à large spectre

Formulation
SC

Composition
Azoxystrobine : 250 g/l

Groupe
FRAC : 11

Culture
Maraîchères | Fruitières |
Vivrière

Cibles

Rouille, Alternariose,
Sclerotiniose, Oïdium,
Mildiou, Anthracnose,
Moniliose, Criblure,
Cercosporiose,
Pyriculariose,
Helminthosporiose,
Septoriose



DIFENOSAV® 250 EC

Fongicide systémique à large spectre

Formulation
EC

Composition
Difenoconazole :
250g/l

Groupe
FRAC : 3

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles

Anthracnose
Rouille,
Alternariose,
Oïdium, Rhizoctone,
Pourriture grise,
Moniliose,
Cercosporiose...

0,5L/ha



ESSEM® 800 WG

Fongicide naturel

Formulation
WG

Composition
Soufre : 800 g/kg

Groupe
FRAC : M2

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Oïdium

5-7,5
kg/ha



savana FONGICIDE



FONGSIN® 450 SC

*Fongicide
systémique à large
spectre*

Formulation
SC

Composition
Thiophanate-
methyl : 450 g/l

Groupe
FRAC : 1

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Oïdium,
Anthracnose,
Maladie des taches
brunes

1-3
l/ha



HIPRO® 500 SC

*Fongicide de
contact large
spectre*

Formulation
SC

Composition
Iprodione : 500 g/l

Groupe
FRAC : 2

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Alternariose,
Botrytis,
Rhizoctone,
Sclerotiniose,
Moniliose

1,5
l/ha



IDEFIX®

*Fongicide -
Bactéricide naturel
pour les cultures
maraîchères et
fruitières*

Formulation
WP

Composition
Hydroxyde de
cuivre : 65.6%

Groupe
FRAC : M1

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Rouille,
Alternariose,
Cladosporiose,
Mildiou,
Anthracnose,
Cercosporiose,
Bactérioses

2-4
kg/ha



MANGA® PLUS 800 WP

*Fongicide de contact
à large spectre
pour les cultures
maraîchères et
fruitières*

Formulation
WP

Composition
Mancozèbe :
800g/kg

Groupe
FRAC : M3

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Mildiou,
Anthracnose,
Rouille,
Cercosporiose,
Alternariose,
Helminthosporiose,
Pyriculariose

2-3
kg/ha

savana FONGICIDE



PROLEV® 722 SL

Fongicide
*Systémique pour
les maladies du sol
et foliaires*

Formulation
SL

Composition
Propamocarbe :
722 g/l

Groupe
FRAC : F4

Culture
Maraîchères

Cibles
Mildiou, Fonte de
semis, Pourriture
des racines

1-2
l/ha



TALO® 720 SC

Fongicide de contact
à large spectre

Formulation
SC

Composition
Chlorothalonil :
720 g/l

Groupe
FRAC : M5

Culture
Bananes | Fruitières
| Maraîchères |
Vivrières

Cibles
Rouille,
Alternariose,
Cladosporiose,
Mildiou,
Anthracnose,
Cercosporiose,
Helminthosporiose,
Septoriose,
Rhynchosporiose,
Oïdium

1-2
l/ha



MOMTAZ® 45 WS

**Insecticide - Fongicide pour
le traitement des semences**

Formulation
WS

Composition
Imidaclopride : 250 g/kg
Thirame : 200 g/kg

Groupe
IRAC : 4A
FRAC : M3

Culture
Toutes cultures

Cibles
Insectes et maladies du sol

50-100 g
pour 10 kg
de semences





NUTRI- TION

Démarrage, Croissance, Production

Engrais liquides NPK avec oligo éléments pour application foliaire.

La gamme FOLIGA est recommandée sur la plupart des cultures maraîchères (tomates, carottes, laitues, poivron, pommes de terre, haricot...), fruitières (agrumes, cacaoyères, caféiers, manguiers, bananiers...), céréalières (maïs, riz, sorgho...) comme complément aux engrais de fond.

Une formule pour chaque étape : Démarrage, Croissance, Production.

Démarrage : FOLIGA® D 12-5-8



Éléments	g/l	p/p
N : Azote Total (1,2% nitrique, 0,6% ammoniacal, 10,2% uréique)	11,8%	10%
P : Phosphore (P205)	4,7%	4%
K : Potassium (K2O)	8,3%	7%
MgO : Oxyde de Magnesium	2360mg/l	200mg/kg
Zn : Zinc (chélaté EDTA et soluble dans l'eau)	24mg/l	20mg/kg
B : Bore	118mg/l	15mg/kg
Mn : Manganese 118mg	118mg/l	15mg/kg
Fe : Fer chélaté EDTA	236mg/l	140mg/kg
Cu : Cuivre Chélaté EDTA	24mg/l	25mg/kg
Mo : Molybdène EDTA	12mg/l	10mg/kg


FOLIGA® D

Repiquage, période de stress

30-45 ml /15L

1-2 applications
Intervalle d'application :
15 - 20 jours

Croissance : FOLIGA® C 12-25-2



Éléments	g/l	p/p
N : Azote Total (uréique)	12%	9,2%
P : Phosphore (P ₂ O ₅)	25,7%	21,2%
K : Potassium (K ₂ O)	2,6%	2,0%
Zn : Zinc	91mg/l	70mg/kg
B : Bore	130mg/l	100mg/kg
Mn : Manganese	130mg/l	100mg/kg
Fe : Fer chélaté EDTA	260mg/l	200mg/kg
Cu : Cuivre Chélaté EDTA	104mg/l	80mg/kg
Mo : Molybdène Chélaté EDTA	13mg/l	10mg/kg

FOLIGA® C

Repiquage, période de stress

30-45 ml /15L

1-2 applications
Intervalle d'application :
15 - 20 jours

Production : FOLIGA® P 4-16-28



Éléments	g/l	p/p
N : Azote Total (uréique)	11,8%	10%
P : Phosphore (P ₂ O ₅)	4,7%	4%
K : Potassium (K ₂ O)	8,3%	7%
B : Bore	2360mg/l	200mg/kg
Mo : Molybdène EDTA	24mg/l	20mg/kg

FOLIGA® P

Chute des pétales, rem-
plissage des fruits :

30-45 ml /15L

2-3 applications
Intervalle d'application :
15 - 20 jours

savana

NUTRITION

Engrais granules /
Solubles



NUTRIGA®

Engrais simples, composés ou complexes destinés à la fertilisation des cultures vivrières et maraichères, ou aux plantations agro-industrielles

LES GRANULÉS

- ASN 26 n
- SKM 14 k
- TRIPLE 17...
- ...

Utilisation

Fertilisation de fonds
Granulométrie suivant
application (manuelle ou
mécanique)

LES SOLUBLES

- PRODUCTION
- SOP 50 k
- ...

Utilisation

Application en solution
dans l'eau, en pulvérisation
foliaire ou en goutte à
goutte dans le réseau
d'irrigation



POLYSULPHATE®

Extrait d'un gisement de polyhalite au Royaume Uni. Engrais granulé à dissolution lente pour un apport continu pendant tout le cycle de la culture. Utilisable en agriculture biologique..

Éléments :

- 14% K₂O (potassium)
- 17% CaO (calcium)
- 6% MgO (magnésium)
- 48% SO₃ (soufre)

100kg/
ha



ULTIMAG®

Engrais granulé à haute solubilité et disponibilité étendue. Source naturelle de potassium, magnésium, calcium et soufre. Utilisable en agriculture biologique. Application en pré-semis à la reprise de végétation.

Élément :

- 12% K₂O
- 5,5% MgO
- 19% CaO
- 42% SO

100-
350kg/
ha

NUTRITION

Engrais granules /
Solubles



NUTRIGA 20 20 20®

NPK 20 20 20 + Oligo éléments en poudre soluble pour application en fertigation ou foliaire.

Eléments :

- 4,8% Azote Nitrique (N-NO₃)
- 4,0% Azote Ammonical (N-NH₄)
- 11,6% Azote Uréique (N-NH₂) \ 20% Anhydride Phosphorique (P₂O₅)
- 20% Oxyde de Potassium (K₂O) \ 197 ppm Fer (Fe)*
- 98 ppm Manganèse (Mn)*
- 20 ppm Zinc (Zn)*
- 20 ppm Cuivre (Cu)*
- 81 ppm Bore (B)
- 9 ppm Molybdène (Mo)

2-4
kg/ha en
foliaire

150-300
kg/ha en
fertigation

100-200
kg/ha pour
les légumes
racines



TIM FOLIUP®

Solution de magnésium en suspension. Sa fine granulométrie < 10 microns permet au magnésium d'être directement absorbé par les stomates des feuilles. Les particules restantes sont assimilées dans les acides organiques.

Eléments:

- 35,9% MgO Oxyde de magnésium
- 52% Mg(OH)₂ Hydroxyde de magnésium

5 à 8L/
ha



NUTRIGA PRODUCTION®

Produit à base de matières premières 100% solubles, application en goutte à goutte dans vos réseaux d'irrigation, ou en pulvérisation par voie foliaire.

Eléments :

- 10% N
- 4% P₂O₅
- 50 % K₂O (42 % K)
- Oligo éléments (chélatés)

100kg/
ha



savana

NUTRITION

Engrais granules /
Solubles



NEUTRAFLORE BTC®

Carbonate de Calcium et de Magnésium granulé additionné de micro organismes.

Flore Bactérienne

Bacillus Amylolyquefaciens > 7 x 10⁶ UFC / Kg

Flore Fongique

Trichoderma Asperellum > 7 x 10⁶ UFC / Kg Coniothyrium Minitans > 7 x 10⁶ UFC / Kg

Eléments:

- 10 % Oxyde de magnésium (MgO)
- 10 % Anhydride sulfurique (SO₃)



100 -
200kg/
ha



MYCO'SOL BTC 13.O.6®

Extrait de vinasse NK additionné de micro organismes.

Flore Bactérienne 5

Bacillus Amylolyquefaciens > 2 x 10⁶ UFC / Kg

Flore Fongique 5

Trichoderma Asperellum > 2 x 10⁶ UFC / Kg Coniothyrium Minitans > 2 x 10⁶ UFC / Kg

Eléments :

- 13 % N (Ammoniacal)
- 6 % Oxyde de potassium (K₂O)
- 40 % Anhydride sulfurique (SO₃)

100 -
150kg/
ha

savana

NUTRITION

Engrais granules /
Solubles



MYCO'SOL ABTC®

Extrait de vinasse NK additionné de micro organismes.

Flore Bactérienne 5

Bacillus Amyloliquefaciens > 2 x 10¹⁰ UFC / Kg

Flore Fongique 5

Trichoderma Asperellum > 2 x 10¹⁰ UFC / Kg Coniothyrium Minitans > 2 x 10¹⁰ UFC / Kg

Eléments

\13 % N (Ammoniacal)

\6 % Oxyde de potassium (K₂O) \40 % Anhydride sulfurique (SO₃)

- **Augmente la nutrition minérale des plantes** Bacillus est capable de rendre disponible du phosphore séquestré dans le sol.

Augmente la nutrition hydrique des plantes

Les champignons mycorhiziens vont créer une relation symbiotique avec les racines des plantes et ainsi augmenter le volume de sol exploré.

Hygiénise localement le sol

Tichoderma et Coniothyrium, en se développant rapidement dans le sol vont « prendre la place » d'éventuels pathogènes (comme les nématodes)



100 -
150kg/
ha



MYCO'SOL BTC 14.O.6®

Extrait de vinasse NK soluble additionné de micro organismes. A utiliser en fertigation.

Flore Bactérienne

Bacillus Amyloliquefaciens > 5 x 10¹⁰ UFC / Kg

Flore Fongique

Trichoderma Asperellum > 5 x 10¹⁰ UFC / Kg Coniothyrium

Minitans > 5 x 10¹⁰ UFC / Kg

Eléments :

- 14 % N (Ammoniacal)

- 6 % Oxyde de potassium (K₂O)

- 40 % Anhydride sulfurique (SO₃) \2 Kg /ha

2kg/ha



savana

NUTRITION

Ameliorateurs de sols



PLAN PROTECT SI BIO®

Mélange de micro algues nutritives et de Diatomées enrichit au CALKONUTRIUM additionné de micro organismes.

Flore Bactérienne 9

Bacillus Amyloliquefaciens > 5 x 10 UFC / Kg

Eléments :

- 15 % Oxyde de potasse (K2O)
- 25 % Anhydride sulfurique (SO3) 30 % Silicium (SiO2)



100 -
150kg/
ha



VEGET PROTECT FLOW BIO®

Engrais granulé mixte qui va venir apporter de la potasse, du calcium, du magnésium et du soufre à la plante. Excellent pour la culture de la pomme de terre.

Eléments

- 4 % Azote (N) organique
- 2,5 % Silicium (Si)



2-3L/ha

NUTRITION

Acide humique



NATURVITAL - PLUS®

Acides humiques provenant de gisements de Léonardite. Contient 21% d'extraits humiques naturels disponibles immédiatement pour les cultures.

Matière active en p/p

- Extrait humique total : 21%
- Acide humiques : 14%
- Acide fulviques : 7%
- Potassium K₂O soluble : 6%

30 à 60l/ha



LEONARDITE®

Léonarde aux propriétés extraordinaires en agriculture. Fort de cette découverte, le groupe DAYMSA s'est spécialisé dans la production d'acide humique à partir de la léonarde de la mine. L'acide humique apporte à la terre une structure spongieuse, ramollit les compactées et relie les sols sableux.



NATURCOMPLET G®

Acides humiques provenant de gisements de léonardite sous forme de granulés. Augmente la fertilité et améliore la structure du sol (capacité d'échange cationique).

Matière active en p/p

Extrait humique total : 50% sms Acide humiques : 42% sms Acide fulviques : 8% sms
 - Azote (N) : 1% spt
 - Oxyde de Potassium K₂O : 5% spt Fer (Fe) : 1,5% sms



30 à 60l/ha



savana

NUTRITION


Biostimulants



SMARTFOIL®

Le Smartfoil est un biostimulant issu de la fermentation (acide anime, acides fluviaux, acides organiques, proline, K, Ca, B) sélectionné avec une souche de *Saccharomyces cerevisiae*, il a pour action d'atténuer l'effet des stress abiotiques (température, sécheresse, tempête de sable, etc...)

1 à 2L/ha



Meilleure réponse si traitement au stade : floraison / nouaison




NATURAMIN-WSP®

Biostimulant très riches en acides animés (80% p/p), avec de forts degrés de serine et de proline, promoteurs de glycine-béatine principaux protecteurs du stress thermique et hydrique. Contient également 12,8% d'azote p/p.

Favoriser l'activité des cultures dans les moments de pics de croissance pour obtenir une productivité maximum.

Aider les espèces végétales à surmonter des situations de stress causées par des phytotoxicités, des sécheresses, des températures extrême et des maladies.

0,5kg/ha



NATURAL WSP®

Biostimulant très riche en auxine naturelle issu d'extrait d'algues. Le NATURAL WSP va avoir un effet tonifiant et activateur de métabolisme : comme l'activité photosynthétique, la formation du fruit ou le développement racinaire. Contient également 12 % de potassium (K2O).

- stimule l'élongation et le grossissement des cellules
- favorise le développement des racines adventives
- améliore les processus de fructification

0,5kg/ha





NATURAMIN PLUS®

Naturamin® Plus produit un effet stimulant sur la culture pendant la phase de développement actif et les périodes de fructification, en particulier dans les situations défavorables à son développement telles que l'asphyxie des racines, sécheresse, grêle et phytotoxicité causée par les pesticides

Culture dosage

Oliver, bananier, agrumes, cultures fruitières, Foliaire: 3-5 traitements durant le cycle à raison de 200-250 cc/Hl.

Fertigation: 10-15 l/ha en 2-3 applications.

Maïs, coton, betterave

Foliaire: 2-3 traitements durant le cycle à raison de 200-250 cc/Hl.

Fertigation: 10-15 l/ha répartis en 3-4 applications.

Luzeerne

Foliaire: à partir de la 2e coupe 200-250 cc/Hl.

Fertigation: à partir de la 2e coupe 5 l/ha. En 2-3 applications.



EFICAL WSP®

Efical®WSP est un produit nutritionnel riche en calcium assimilable. Il est formulé avec des acides aminés libres et des complexes organiques tels que l'acide citrique et d'autres hydrates de carbone, qui permettent une meilleure absorption et translocation du calcium dans les tissus végétaux

Dosage

* Application foliaire : 2-3 kg/ha par application.

* Fertigation : 15-25 kg/ha répartis en plusieurs applications

2-3kg/
ha






RAIZA®

Biostimulant / Enraciner, conçu pour renforcer et stimuler le développement des racines.

RAIZA va permettre également de réduire le stress post-translation, pour une plus grande survie des plantes après repiquage. Contient en plus des oligo-peptides, des alginates, des oligo et polysaccharides, des hormones végétales d'origine naturelle, et des vitamines. Tous ces composants proviennent d'extraits d'algues *Ascophyllum nodosum*.



3 à 5l/ha



CYTOPLANT 400®

Promoteur physiologique, stimule la division cellulaire.

Le CYTOPLANT a une haute activité en cytoquinines totalement d'origine naturelle.

- Induit la division cellulaire
- Augmente le nombre de fleurs
- Réduit la dominance apicale (diminue les entre noeuds, permet d'avoir 1 étage de plus).
- Améliore le poids, le calibre et la coloration en favorisant la croissance latérale des cellules.



1,5l/ha



NATURFRUIT COLOR®

Formulation spécialisée à haute concentration en potassium organique, qui accélère l'assimilation et le transport de la potasse dans la plante jusqu'aux fruits.

Ce qui a pour effet :


- D'améliorer et accélérer la production et la mobilisation des sucres dans le fruit.
- Augmenter significativement le poids et la production.
- Éviter une maturation inégale et permet d'obtenir un meilleur remplissage des fruits.



PLENIFLOR®

Activateur de la floraison et de la nouaison à base de Bore, Molybdène. Le PLENIFLOR va stimuler les processus physiologiques de la plante liés à la floraison et la nouaison, afin d'améliorer la pollinisation.

Contient également des polysaccharides, de l'acide alginique, du mannitol, des cytokines naturelles (rôle dans la division cellulaire), d'autres micro nutriments et vitamines, tous issus des extrait d'algues.





NATURMIX FE 7®

Mix de oligo-éléments en poudre soluble chélatés par EDTA ou EDDHA (sauf B et Mo sous forme minérale). Possède une forte concentration en fer.

- Fer (Fe) soluble dans l'eau : 7%
- Fer (Fe) chélaté par EDTA : 6,5%
- Fer (Fe) chélaté par EDDHA : 0,5%
- Bore (B) : 0,6%
- Cuivre (Cu) chélaté par EDTA : 0,25%
- Manganèse (Mn) chélaté par EDTA : 3%
- Molybdène (Mo) : 0,1%
- Zinc (Zn) chélaté par EDTA : 0,6%

2kg/ha



NATURQUEL FE 4.0®

Correcteur de carences en fer avec une grande concentration en fer chélate ortho-ortho EDDHA, Forme la plus efficace pour corriger la chlorose ferrique. Permet d'apporter du fer aux plantes, en maintenant une grande stabilité dans le sol, même avec un pH élevé.

Matière active en p/p

- Fer (Fe) soluble dans l'eau : 6%
- Fer (Fe) chélaté par ortho-ortho-EDDHA : 4%
- Fer (Fe) chélaté par EDDHA : 2%

3 - 8kg/ha



MATURAPHON® 480 SL

Maturateur - Régulateur de croissance

Formulation
SL

Composition
Ethephon : 480 g/l

Culture
Maraîchère | Ananas

0,5-2,5 l/ha



NATURSAL EXPRESS®

Naturesal-Express est la base pour lutter contre la salinité de l'eau grâce au calcium chélaté qu'il contient et aux réactions de ses acides organiques avec le sol.

Ces réactions se traduisent par la libération du calcium, qui vient remplacer le sodium absorbé auparavant par les argiles.

Matière active en p/p

- Calcium (CaO) soluble dans l'eau : 12,7%
- Acides Polyhydroxycarboxyques : 25%

Dosage en fonction des sols :

- Sol compact : 20-40 L/ha.
- Sol salins : 40-60 L/ha.
- Sol battant, croûte : 50-60 L/ha



NATURQUEL-CA/B®

Correcteur de carences en calcium et bore.

- Améliore la qualité des récoltes.
- Améliore la consistance des fruits durant et après la récolte.

Matière active en p/p

- Oxyde de Calcium (CaO) : 17 % \ Bore (B) : 2%

2 - 3l/ha



CALCIFRUIT®

Correcteur de carences en calcium et protège le fruit en augmentant sa fermeté.

Le calcium va aussi jouer un rôle dans le contrôle des physiopathologies suivantes :

- Pourritures apicales aseptiques de la tomate, du concombre, du poivron.
- Fruits à noyaux et agrumes fendus
- Nécrose foliaire de la laitue.

Matière active en p/p

- Calcium (CaO) : 17 %

4 - 6l/ha

savana

LES ADJUVANTS



WETTER.E®

WETTER.E est un adjuvant destiné aux traitements herbicides, fongicides et insecticides.

Sa composition lui permet d'avoir deux actions spécifiques :

- Effet Mouillant
- Effet Étalant

Améliore la qualité de la pulvérisation.

Booste l'efficacité des produits phytosanitaires en augmentant la surface de contact.

100ml
/100l

WETTER.M®


WETTER.M est un adjuvant destiné aux traitements hybrides, fongicides et insecticides.

Sa composition lui permet d'avoir trois actions spécifiques :

- Effet mouillant
- Effet étalant
- Effet Pénétrant

Idéal pour les produits symétriques et notamment les fongicides.

100ml
/100l



WETTER PX 05®

WETTER.PX 05 est un Hydro-réteneur liquide destiné à l'amélioration de la rétention de l'eau dans la zone racinaire. WETTER PX 05 permet ainsi d'optimiser l'efficacité de l'irrigation, diminuer les coûts de pompage, réduire le stress hydrique et d'augmenter le rendement des cultures.

Doage : 3 applications espacées de 2 à 3

4l/ha

2l/ha

2l/ha



SEMENCES





CONCOMBRE - TYREKE F1

Tyreke est un hybride facile à cultiver qui s'adapte bien à des zones de production diversifiées. Il montre une forte vigueur à la fois sur la tige principale et les pousses latérales. Les fruits sont de bonne qualité, longs et vert moyen à foncé. De plus, l'uniformité de la taille et de la forme est très élevée.




CONCOMBRE - MONA LISA F1

Il a une grande adaptabilité et produit bien dans les périodes où les conditions de culture ne sont pas optimales. Les fruits sont grands et très uniformes en forme et en taille. La couleur des fruits est vert foncé, la qualité de la chair est ferme et croustillante. Il a une résistance intermédiaire à l'oïdium et au mildiou, à la tâche angulaire et au virus de la mosaïque du concombre. Recommandé pour les conditions de culture semi-tropicales ou pour des régions tropicales à altitude élevée.



CONCOMBRE - SAIRA F1

Cet hybride a une très forte vigueur et une capacité de continuer à produire des fruits sur une longue période. Le fruit peut être moyen ou long, en forme de bloc avec une couleur vert foncée à moyenne. La peau des fruits est très lisse.



PASTEQUE - MARMARA F1

Il montre une forte vigueur végétale combinée à une maturité précoce. Les fruits sont oblongs et larges avec un fond vert clair et des rayures vertes. La chair est de couleur rouge foncée et très douce.



PASTEQUE - WAKANDA F1

Un hybride vigoureux à qualité de fruit excellente. Les fruits ont une peau épaisse idéale pour le transport sur de longue distance. Ils sont uniforme et de gros calibre d'où un rendement élevé. Cette variété a une bonne adaptabilité et peut donc être produit tout au long de l'année.



PAPAYE - VEGA F1

Un hybride vigoureux de type semi-nain, une bonne capacité à fructifier et un potentiel de rendement élevé. Il produit des fruits très uniformes et de taille moyenne, ce qui en fait un produit idéal pour les marchés qui préfèrent cette taille. En ce qui concerne la qualité interne, sa couleur est rouge attrayante et sa chair est ferme et très douce.



PAPAYE - RED ROYALE F1

Red Royale se distingue par sa taille naine. Les premiers fruits se forment juste au-dessus du niveau du sol et l'arbre se développe lentement en hauteur, ce qui facilite la récolte et l'entretien de la culture. Il fructifie très facilement. Les fruits sont gros, doux, avec une chair épaisse de couleur rouge foncé. Il peut être utilisé à la fois pour une consommation fraîche et pour la fabrication de jus.



PAPAYE - MARADONA F1

Les plants de Maradona sont de type semi-nain mais très vigoureux, et développent une grande canopée. Les fruits sont gros, avec une forme allongée parfaite en bloc. La chair est épaisse avec une couleur rouge attrayante. Ses fruits sont largement appréciés pour leur texture ferme et leur douceur.



PAPAYE - CHARA F1

Un hybride monoïque vigoureux, avec une formation de pousses latérales décente. Il fonctionne bien dans une large gamme de conditions de croissance. Le fruit est vert moyen à foncé, moins collant et une bonne durée de conservation.



OIGNON - DAYO

Une sélection de jours courts montrant un fort développement du feuillage et une bonne performance sur le terrain. Les bulbes sont de couleur rouge clair, arrondis et très fermes. Il montre une uniformité très élevée en couleur, en taille et en forme. Dayo produit des bulbes relativement gros avec une très longue durée de conservation dans des conditions simples allant jusqu'à 3-5 mois.



OIGNON - TERIA F1

Teria est un hybride développé pour des marchés qui préfèrent les bulbes de type violet de Galmi avec un excellent habilité de stockage. Cette variété possède de plantules solide, des bulbe de gros bulbe et moins de double-cœur comparée à la variété locale. De plus, elle fleurit très rarement lorsqu'elle est semé dans son créneau.



OIGNON - RED JEWEL F1

Un hybride recommandé pour la culture dans des conditions chaudes et humides. Il montre une vigueur modérée à forte. Les bulbes sont en forme de globe plat et présentent une très bonne uniformité en taille et en forme. La couleur est rouge vif et le goût est modérément piquant. Cette variété montre une bonne tolérance au fractionnement et les bulbes sont très centrés.



PIMENT - PIQUANTE RED F1

Cet hybride produit des plantes vigoureuses portant de nombreux fruits. La forme des fruits est légèrement rectangulaire et très uniforme. Immature, les fruits sont brillant vert vif et deviennent rouge foncé lorsqu'ils sont complètement mûrs. Il est très piquant avec un goût aromatique attrayant.



PIMENT - DEMON F1

Demon est une variété très vigoureuse avec une performance fiable dans des circonstances variées. Les plantes sont grandes et droites portant un nombre important de fruits. L'attraction de Demon est la qualité de ses fruits, fermes, très belle couleur rouge vif, et uniforme en taille et en forme.



PIMENT - PIQUANTE YELLOW F1

Cette produit des plants moyennement vigoureux à très vigoureux associés à une maturité moyennement précoce. Elle fournit une bonne couverture pour protéger les fruits contre les coups de soleil. Les fruits sont de couleur jaune vif lorsqu'ils sont complètement mûrs, très piquants et aromatiques



PIMENT - TONGLA F1

Un hybride à maturité tardive, très vigoureux. Recommandé aussi bien pour la culture pluviale que pour la culture irriguée. Tongla montre une forte résistance aux maladies transmises par le sol ainsi qu'aux virus fréquents et aux insectes piqueur-suceurs. Il porte des fruits ascendants. Les fruits sont de haute qualité, fermes, très piquants, vert foncé en stade immature et rouge brillant au stade mature



POIVRON - KAVERI F1

Kaveri est recommandé pour être cultivé en plein champ mais il produit aussi bien sous la la serre. Il a une forte vigueur et une canopée quelque peu ouverte. Il a une capacité à fructifier facilement et il est précoce. Les fruits sont en bloc et restent assez uniformes pendant toute la saison de récolte. La couleur est vert moyen tournant vers un rouge attrayant a l'état de maturité.



POIVRON-GANGA

Cette variété est une sélection variétale d'East-West du type California Wonder. La plante est vigoureuse avec un rendement très élevé. Les fruits sont presque en bloc avec la peau épaisse et ont une très belle couleur vert foncé.

TOMATE - ANITA F1



Anita F1 est un hybride avec un haut niveau de fructification donnant des fruits de bonne taille et de belle forme. Il a une bonne résistance aux maladies foliaires toute chose qui aide à garder le couvert végétatif longtemps et à allonger la récolte. Cet hybride est recommandé dans les zones à moyenne et faible élévation et durant la saison pluvieuse.

TOMATE - PADMA F1



Padma a une bonne adaptation aux climats chauds et humides. La vigueur de la plante est modérée à forte. Les fruits sont assez arrondis avec une bonne fermeté et une belle couleur rouge lorsqu'ils sont complètement mûrs. Excellente performance dans les zones tropicales de basse altitude et pendant la saison des pluies.

TOMATE - PLATINUM F1



Un hybride qui convient le mieux à la culture dans les régions tropicales à basse altitude. Il montre une forte vigueur et une grande adaptabilité à différentes conditions de cultures. Les fruits sont ronds, fermes et de taille moyenne. Sa résistance excellente aux maladies et sa fructification même en périodes chaudes sont les raisons pour lesquelles cet hybride est devenu très populaire.

TOMATE - TANDI F1



Une performance exceptionnelle en ce qui concerne la précocité, le rendement, la taille des fruits et la qualité des fruits. Elle est recommandée pour les zones tropicales à altitude moyenne et pendant la saison sèche fraîche. Les plants sont de types compacts et petits. Un espacement réduit entre les plants peut être considéré. La fructification est facile et concentrée. Les fruits sont allongés et de grande taille. La fermeté des fruits et la durée de conservation sont très bonnes.





AUBERGINE BLACK BEAUTY

Assure une bonne production au producteur durant toute l'année. Black Beauty produit des fruits de forme globe d'un noir brillant

Maturité : moyenne
Forme : Globe
Taille du fruit : 15 x 12 cm
Couleur du fruit : Violet sombre / noire
Résistance / Tolérance : N/A.



AUBERGINE EUROPÉENNE

Maturité : moyenne
Forme : Globe
Taille du fruit : 15 x 12 cm
Couleur du fruit : Violet sombre / noire
Résistance / Tolérance : N/A.



AUBERGINE SAFY

Variété précoce avec des fruits de calibre moyen. Safy peut être produite en saison sèche et pluvieuse

Maturité : moyenne
Forme : ovale
Taille du fruit : 15 x 18 cm
Couleur du fruit : Violet sombre / noire
Résistance / Tolérance : N/A



GOMBO CLEMSON

Maturité : 55 jr
Forme : Gousse à angle
Taille du fruit : 10 x 2 cm
Couleur du fruit : Vert foncé
Résistance / Tolérance : N/A



CAROTTES NANTAISE

Variété de saison, productive à la racine demi-longue et cylindrique. Chair rouge, très sucrée et douce. On la consomme crue ou cuite et ses fanes sont comestibles préparées en soupe. Excellente conservation.



CAROTTES KURODA

Maturité : 100 jr
Forme : Allongée en pointe
Taille du tubercule : 18 à 5 cm
Couleur du tubercule : Orange brillant
Résistance / Tolérance : N/A



POIVRON YOLO WONDER

Maturité : 77 jr
Forme : Carrée / 3 à 4 chambres
Taille du fruit : 10 x 9 cm
Couleur du fruit : Vert à Rouge
Piquant : très piquant
Résistance / Tolérance : TmO



POIVRON MAGELLAN

Variété de haut rendement présentant un grand nombre de résistances et de tolérances. Magellan à un très bon comportement durant les saisons fraîches et sèches en région tropicale.



SUGAR BABY

Maturité : 80 jr
Forme : Rond
Poids : 4 à 5 kg
Couleur du fruit : Vert foncé
sombre
Couleur de la chair : Rouge
Résistance / Tolérance : N/A



CHARLESTON GREY

Maturité : 85 jr
Forme : Allongée
Poids : 12 à 15 kg
Couleur du fruit : Fond vert
clair / Légères
rayures vertes
Couleur de la chair : Rouge
Résistance / Tolérance : N/A



PASTEQUE KAOLACK

Maturité : 85 jr
Forme : Ovale
Poids : 5 à 6 kg
Couleur du fruit : Fond vert
clair / Légères
rayures vertes
Couleur de la chair : Rouge
Résistance / Tolérance : N/A



CRIMSON SWEET

Maturité : 85 jr
Forme : Ovale
Poids : 10 à 12 kg
Couleur du fruit : Fond vert
clair / Rayures
vert foncé
Couleur de la chair : Rouge
Résistance / Tolérance :
Anthracnose (Nuile
rouge) / Fusariose



PIMENT CHILI TITAN F1

Variété très productive
de couleur vert clair, très
rustique et très résistant.



PIMENT CHILI BLANC F1

Maturité : moyenne
Forme : Triangulaire /
Allongée
Taille du fruit : 75 cm
Couleur du fruit : Vert clair
Piquant : très piquant
Résistance / Tolérance : N/A



PIMENT DE CAYENNE

Maturité : 75 jr
Forme : Allongée
Taille du fruit : 17 x 1,7 cm
Couleur du fruit : Vert à rouge
Piquant : très piquant
Rendement : Très productif
Résistance / Tolérance : N/A



PIMENT FARIMA F1

Piment puissant : résistant
ultra-productif et hautement
rentable!



TOMATE RIO GRANDE

Maturité : moyenne
Type de plante : Déterminée
Forme : Allongée / Carrée
Poids du fruit : 110 g
Couleur du fruit : Vert à Rouge



TOMATE EQUATOR F1

Hybride très productif et résistant. Equator à des fruits de forme arrondie, ferme et assure une bonne tenue post récolte.



TOMATE UC82 PETOMECH

Maturité : moyenne
Type de plante : Déterminée
Forme : Allongée / Carrée
Poids du fruit : 100 g
Couleur du fruit : Vert à Rouge
Résistance / Tolérance :
Verticilliose,
Fusariose 1 et 2





CONCOMBRE ROCCO F1

C'est une variété hybride pour la culture en plein champ et sous abri en zone tropicale. Rocco F1 donne des fruits vert foncé, cylindrique et uniforme avec un rendement élevé.



BETTERAVE DETROIT

Maturité : moyenne
Forme : Ronde plate
Poids du tubercule : 2 à 3 kg
Couleur du tubercule : Rouge foncé
Résistance / Tolérance : N/A



OIGNON VIOLET DE GALMI

Originaire du Niger, c'est une variété tropicale qui se cultive plutôt en saison sèche. Réputé en Afrique de l'Ouest, il est inimitable par son goût assez piquant et sa peau est rosée violacée. L'oignon violet de Galmi est une variété précoce.



MAÏS MASTROP.143

Une variété performante,
stable et sécurisante
**UN RENDEMENT ELEVÉ DANS
TOUTES LES CONDITIONS**
MASTROP.143 ne cessera de
vous surprendre du semis à la
récolte.

**UNE VARIÉTÉ ADAPTÉ À
TOUT LE TERRITOIRE**

Vous pouvez semer
MASTROP.143 dans toutes les
zones de culture du maïs.

UNE VARIÉTÉ SAINÉ

La variété MASTROP.143 a une
bonne tolérance aux maladies
du feuillage et ne desséchera
pas prématurément



MAÏS

Maturité : précoces

**Utilisation : grain, ensilage,
mixtes**

Résistance maladie :
résistantes à l'helminth
osporiose, résistantes à la
fusariose, résistantes au
piétin-verse


**Autres
caractéristiques : hybrides,
résistantes à la verse,
cornées, adaptées aux zones
sèches**



SORGHO FOURRAGER MULTI COUPE

Le sorgho fourrager, membre
de la famille des poacées
(graminées), partage des
similitudes avec le maïs, mais
se distingue par sa capacité à
tolérer la sécheresse grâce à
son système racinaire robuste.

PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE





ZI DIAMNIADIO
Dakar, Sénégal

+ (221) 33 943 44 80
+ (221) 77 149 68 68
www.albisia-senegal.sn